

ЗНО 2017 року з математики — додаткова сесія

При выполнении заданий с кратким ответом отметьте верный ответ или впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.


1. Скоротіть дріб $\frac{10ab^3}{5a^2b}$.

А) $\frac{2b^2}{a}$ Б) $\frac{b^4}{2a^3}$ В) $50a^3b^4$ Г) $\frac{2b^4}{a^3}$ Д) $\frac{b^2}{2a}$

2. Розв'яжіть рівняння $x^2 - 10 = 5x + 14$.

А) -8; 3 Б) -4; -1 В) -3; 8 Г) 1; 4 Д) 0; 5

3. Функція $y = f(x)$ визначена й зростає на проміжку $[-3; 2]$. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку $[-3; 0]$. Яка з наведених точок може належати графіку цієї функції?



А) K Б) L В) O Г) M Д) N


4. Точка B належить відрізку AC. Визначте відстань між серединами відрізків AB і BC, якщо $AB = 10$ см та $BC = 5,2$ см.

А) 2,4 см Б) 2,6 см В) 5,0 см Г) 7,6 см Д) 10,2 см

5. У таблиці наведено дані про температуру повітря в різний час того самого дня.

Час, години	6	9	12	15	18
Температура, °C	12	17	14	18	15


На графіках немає шкали (градусів) температури повітря. На якому з графіків правильно відображено дані, наведені в таблиці?



А)

Б)

В)



Г)

Д)

А) А Б) Б В) В Г) Г Д) Д

6. Розташуйте в порядку зростання числа $\frac{5}{17}$, $\frac{5}{18}$, $\frac{6}{17}$.

А) $\frac{5}{17}$, $\frac{5}{18}$, $\frac{6}{17}$ Б) $\frac{5}{18}$, $\frac{5}{17}$, $\frac{6}{17}$ В) $\frac{6}{17}$, $\frac{5}{17}$, $\frac{5}{18}$ Г) $\frac{5}{18}$, $\frac{6}{17}$, $\frac{5}{17}$
Д) $\frac{5}{17}$, $\frac{6}{17}$, $\frac{5}{18}$


7. У прямокутній системі координат у просторі задано сферу з центром у точці M. Відрізок AB — діаметр цієї сфери. Визначте координати точки M, якщо A (2; -1; 0) та B (8; 3; 2).

- А) (10; 2; 2) Б) (6; 4; 2) В) (3; 2; 1) Г) (5; 1; 2) Д) (5; 1; 1)

8. Яке з наведених чисел є розв'язком подвійної нерівності $5 \leq 3^x \leq 15$?

- А) 5 Б) 4 В) 3 Г) 2 Д) 1

9. На рисунку зображено фрагмент графіка однієї з наведених функцій на проміжку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Укажіть цю функцію.



- А) $y = 2 \sin x$ Б) $y = \frac{1}{2} \sin x$ В) $y = -2 \sin x$ Г) $y = -\frac{1}{2} \cos x$
Д) $y = 2 \cos x$

10. Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $x^2 + 4$.

- А) $(x+2)(x-2)$ Б) $x(x+4)$ В) $(x+2)^2 + 4x$ Г) $(x+2)^2$
Д) $(x-2)^2 + 4x$

11. Довжина сторони ромба дорівнює 12 см. Визначте довжину більшої діагоналі цього ромба, якщо його тупий кут дорівнює 120° .

- А) $6\sqrt{3}$ см Б) $8\sqrt{3}$ см В) 12 см Г) $12\sqrt{3}$ см Д) 24 см

12. Площини α і β паралельні. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Існує пряма, що лежить і в площині α і в площині β .

ІІ. Якщо пряма перпендикулярна до площини α , то вона перпендикулярна до площини β .


ІІІ. Якщо пряма лежить у площині α , то вона паралельна будь-якій прямій у площині β .

- А) лише І Б) лише І та ІІ В) лише ІІ Г) лише ІІ та ІІІ Д) лише ІІІ

13. Розв'яжіть нерівність $\frac{2x-4}{x+1} < 0$.

- А) $(-\infty; 2)$ Б) $(-\infty; -1) \cup (-1; 2)$ В) $(-1; 2)$ Г) $(-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$
Д) $(-\infty; -1)$

14. Підлога кімнати має форму квадрата. На ній лежить квадратний килим, кожна сторона якого віддалена від найближчої стіни кімнати на 20 см (див. рисунок). Визначте периметр килима, якщо периметр підлоги дорівнює 18 м. Наявність плінтусів на підлозі знехтуйте.



- А) 10 м Б) 13,6 м В) 15,8 м Г) 16,4 м Д) 17,2 м

15. Якщо $2 \sin a = \cos a$, то $\operatorname{tg} a$?

- А) -2 Б) -0,5 В) 0,2 Г) 0,5 Д) 2

16. В арифметичній прогресії (a_n) перший член $a_1 = -21$, різниця $d = 1,5$. Скільки всього від'ємних членів має ця прогресія?

- А) 13 Б) 14 В) 15 Г) 16 Д) 18

17. Якщо $a < 1$, то $|a-1| + |-7|$?

- А) $a-8$ Б) $a+6$ В) $-a+6$ Г) $-a-6$ Д) $-a+8$

18. Обчисліть інтеграл $\int_0^2 (f(x) + 6) dx$, якщо $\int_0^2 f(x) dx = 8$.

- А) 20 Б) 14 В) 2 Г) 28 Д) 48

19. Визначте площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, довжина сторони основи якої дорівнює 10 см, а довжина бічного ребра — 13 см.

- А) 180 см^2 Б) $15\sqrt{69} \text{ см}^2$ В) $30\sqrt{69} \text{ см}^2$ Г) 360 см^2 Д) 390 см^2

20. Якому проміжку належить корінь рівняння $\log_2 x = 2 \log_2 3$.


- А) $(0; 2]$ Б) $(2; 4]$ В) $(4; 6]$ Г) $(6; 8]$ Д) $(8; 10]$

21. Установіть відповідність між функцією (1–4) та прямою, зображеною на рисунку (А–Д), яка не має з графіком цієї функції жодної спільної точки.


Функція

1. $y = \operatorname{tg} x$ 2. $y = \sqrt{x} - 2$ 3. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 4. $y = -\pi$


Ескіз графіка функції




А




Б



В



Г



Д

А
Б
В
Г
Д

1
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

22. Установіть відповідність між виразом (1–4) та твердженням про його значення (А–Д) при $a = 15$.

Вираз

1. $\frac{7}{3}a$
2. $2a - 1$
3. $a^2 + 12a + 36$
4. $a^2 - 13^2$

Твердження про значення виразу

- А менше за 20
Б є простим числом
В є парним
Г ділиться націло на 3
Д ділиться націло на 5

А
Б
В
Г
Д


1
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

23. Рівносторонній трикутник ABC та рівнобедрений трикутник ACD , у якому $AC = DC$ і $\angle ACD = 40^\circ$, лежать в одній площині (див. рисунок). Установіть відповідність між кутом (1–4) та його градусною мірою (А–Д).



Кут

1. $\angle ABC$
2. $\angle ADC$
3. кут між прямими AB і AD
4. кут між бісектрисами кутів BAC і CAD


Градусна міра кута

- А 45°
- Б 50°
- В 60°
- Г 65°
- Д 70°


А
Б
В
Г
Д

- 1
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 2
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 4
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

24. Установіть відповідність між фігурою (1–4) і тілом обертання (А–Д), утвореним унаслідок обертання цієї фігури навколо прямої, зображеної пунктиром.



Тіло обертання



А
Б
В
Г
Д

- 1
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 2
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 4
☐ ☐ ☐ ☐ ☐


25. Для приготування чайної суміші змішали індійський та цейлонський чай у відношенні $10 : 13$, причому індійського чаю вийшло 180 г.

1. Скільки грамів чайної суміші отримали?
2. На скільки відсотків у суміші цейлонського чаю більше, ніж індійського?

26. На рисунку зображено прямокутник $ABCD$ і кругові сектори KAM та BSP , що мають одну спільну точку O . Площа сектора BSP дорівнює $9\pi \text{ см}^2$, $AO = 4 \text{ см}$.

1. Визначте радіус сектора BSP (у см).

2. Обчисліть площу прямокутника $ABCD$ (у см^2).



27. Знайдіть область визначення функції $y = \sqrt[4]{50 - 3x}$. У відповіді запишіть найбільше ціле двоцифрове число, що належить області визначення цієї функції.

28. Човен проходить 24 км за течією ріки за 5 годин і 12 км проти течії за 3 години. Визначте швидкість течії ріки (у км/год). Уважайте, що власна швидкість човна та швидкість течії незмінні.

29. Спортсмен робить один постріл у мішень. Імовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більш а за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть імовірність того, що спортсмен улучить у мішень.

30. У прямокутній системі координат на площині задано вектор $\vec{a}(-1; 1)$ та $\vec{b}(-1; 2)$. Визначте значення m , за якого вектори $\vec{a} + m\vec{b}$ та $\vec{b}$ перпендикулярні.

31. Задано функцію $f(x) = x^2 + 3x - 10$.

1. Визначте координати точок перетину графіка функції f з осям і координат.

2. Побудуйте графік функції f .

3. Знайдіть похідну функції f .

4. Визначте кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції f у точці з абсцисою $x_0 = -1$.

32. Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є прямокутник $ABCD$, у якому діагональ $AC = \alpha$, $\angle BAC = \beta$. Площина, що проходить через вершину верхньої основи та діагональ нижньої основи призми, утворює з площиною основи гострий кут α . Визначте об'єм заданої призми.

33. Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} (2x + a)^2 = (2y + a)^2, \\ \sqrt{3ax - 8x - 6y} = x, \end{cases}$$

залежно від значень параметра a .